

ЗАДАНИЕ II: Статистическая физика, VI семестр, 2005 год

1. Для частиц максвелловского газа:
 - а) записать распределение по компонентам скоростей;
 - б) найти $\langle\langle v_x^2 \rangle\rangle, \langle\langle v^2 \rangle\rangle$;
 - в) найти наиболее вероятную абсолютную величину импульса;
 - г) записать распределение по кинетической энергии;
 - д) вычислить среднее значение, дисперсию и наиболее вероятное значение энергии;
 - е) найти среднее время, необходимое для пролета расстояния ℓ в пренебрежении столкновениями частиц между собой; привести численную оценку при $\ell \sim 10^{-6}$ м для воздуха при н.у.: $\bar{n} \approx 3 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$;
 - ж) определить полную плотность потока $\mathcal{J}_\Sigma(N_\Sigma)$ частиц из сосуда с разреженным идеальным газом при температуре T через малое отверстие Σ в стенке сосуда; найти среднюю энергию и среднюю абсолютную скорость частиц в этом потоке: (1) не учитывая изменение концентрации частиц, $\bar{n} = \text{const}$, внутри сосуда; (2) учитывая изменение концентрации $\bar{n} \Rightarrow \bar{n}(t)$, найти среднее время пребывания частицы в сосуде.
2. Найти среднее значение абсолютной скорости и кинетической энергии молекул тонкой пленки, пренебрегая взаимодействием молекул друг с другом. Вычислить "давление" этого идеального двумерного газа при температуре T , считая известной поверхностную концентрацию частиц $\bar{n} = N/\Sigma$.
3. Найти диэлектрическую проницаемость $\epsilon(T)$ Больцмановского газа полярных молекул с собственным электрическим дипольным моментом d_0 , помещенного во внешнее однородное электрическое поле E . Исследовать случаи слабого, $d_0E/kT \ll 1$, и сильного, $d_0E/kT \gg 1$, электрического поля. Вычислить дополнительную теплоемкость, приобретаемую этим газом в слабом электрическом поле. Как изменяются эти результаты с учетом поляризуемости молекул газа: $\mathbf{d} = \mathbf{d}_0 + \alpha E$?
4. Найти флуктуацию диэлектрической проницаемости, как функции температуры T и плотности \bar{n} : $\epsilon = \epsilon(\bar{n}, T)$.
5. Солнце излучает как равновесное черное тело с лучевой интенсивностью излучения с единицы поверхности, независящей от направления излучения \mathbf{v} , т.е. $\mathcal{I}_\omega(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = \mathcal{I}_\omega^0$, при $|\mathbf{r}| = a_\odot$. Найти зависимость от $\mathbf{r} = r\mathbf{n}$ плотности энергии излучения $u(r) = \langle\langle u(T_r) \rangle\rangle$ и полной радиальной плотности потока $\mathcal{J}_r(\mathbf{n})$, и установить связь между ними при $|\mathbf{r}| \gg a_\odot$, и $|\mathbf{r}| = a_\odot$. Считая видимый с Земли угловой диаметр Солнца, $2\beta \approx 0.01$, а саму Землю, – черным телом, находящимся в тепловом равновесии с излучением на своей орбите, найти связь температур их поверхностей.
6. Спектральная плотность фононов $\overline{\mathcal{D}}(\omega, V)$ зависит от единственного размерного параметра $\omega_M(V)$. Получить уравнение состояния **всего** кристалла в форме Грюнайзена. Найти постоянную Грюнайзена, если средняя скорость звука \bar{c} не зависит от объема V , а вид $\omega_M(V)$ определяется ею и объемом по размерности.
7. Найти среднеквадратичное смещение одного атома дебаевского кристалла из положения равновесия, предполагая статистическую независимость отдельных временных Фурье гармоник $\mathbf{r}(\omega)$ смещения $\tilde{\mathbf{r}}(t)$. Рассмотреть предельные случаи $T \ll \theta_D, T \gg \theta_D$.

8. Найти химпотенциал, уравнение адиабаты, и записать выражения для теплоемкости и давления двумерного ферми газа в зависимости от температуры и плотности.
9. Найти химические потенциалы, уравнения состояния и параметры вырождения идеальных **ультратрелятивистских** $\varepsilon = cp$, одномерных квантовых газов бесспиновых бозонов, и фермionов со спином $1/2$, с плотностью $\bar{n}_{(B),(F)} = N_{(B),(F)}/L$, при температуре T . Сравнить их плотности, энергии, давления и энтропии для химпотенциала $\mu_{(F),(B)} = 0$. Отбрасывая бесконечные, независящие от температуры вклады вакуумных энергий, сравнить их термодинамические потенциалы при температуре T и нулевых химических потенциалах. И тоже соответственно для трехмерных газов в ящике объемом V .
10. Найти *точный* большой потенциал, полное давление $P(T, \mu) = P_{e^-} + P_{e^+}$, полную энтропию $S(T, \mu)$, полный заряд и внутреннюю энергию ультратрелятивистского электрон-позитронного ферми газа, находящегося в динамическом равновесии с чернотельным излучением при температуре T . Рассмотреть предельные случаи $T \gg \mu$ и $T \ll \mu$. (Использовать систему единиц, в которой $\hbar = c = k_B = 1$.) Указание: выразить $\mathcal{F}_3(y) + \mathcal{F}_3(-y)$ через $\mathcal{F}_0(\pm y)$ и $\mathcal{F}_{0,1,2,3}(0)$, установив интегрированием по частям, что:

$$\frac{d\mathcal{F}_\nu(y)}{dy} = \nu \mathcal{F}_{\nu-1}(y), \text{ для } \mathcal{F}_\nu(y) = \int_0^\infty \frac{x^\nu dx}{\exp(x-y)+1}.$$

11. Найти уравнение адиабаты в таком равновесном газе, нагретом до столь высокой температуры, что его давление в $7/4$ раза выше давления излучения: $P_{e^-} + P_{e^+} = (7/4)P_\gamma$; может ли оно быть меньше этой величины? Какова скорость звука $v_{\text{зв}} = \sqrt{(\partial P / \partial \rho)_S}$ в таком газе?
12. Найти T_F , уравнение состояния и теплоемкость вырожденного релятивистского ферми – газа с $\varepsilon(p) = \sqrt{c^2 p^2 + m^2 c^4}$, с заданной плотностью \bar{n} . Каково условие вырожденности такого газа?

Сдать до мая с.г.